



ข่าวเตือน

การระบาดของศัตรูพืช

มิถุนายน 2566

สำนักเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร



เฝ้าระวัง! หอยหรือทากในกล้วยไม้

สภาพอากาศในช่วงนี้ฝนตก
อากาศร้อนชื้น
เดือนผู้ปลูกกล้วยไม้
ในทุกกระยะการเจริญเติบโต
รับมือหอยหรือทาก

การเข้าทำลาย

- หากพบหอยหรือทากที่พื้น > 10 ตัวต่อตารางเมตร ให้ทำการป้องกันกำจัดทันที
- เข้าทำลายโดยการกินราก ยอดอ่อน และดอกของกล้วยไม้ ทำให้ชะงักการเจริญเติบโตและผลผลิตเสียหาย

ที่มา: กรมวิชาการเกษตร, กรมส่งเสริมการเกษตร

การป้องกันกำจัด

กรณีพบที่พื้น
พบหอยหรือทาก > 10 ตัวต่อตารางเมตร ให้ทำการป้องกันกำจัด โดย พ่นด้วยนิโคซซาไมด์ โอลามีน 83.1 % ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ใช้เหยื่อพิษสำเร็จรูปเมทลดีไฮด์ 5 % จีบี วางรอบโคนเสาว์สดูปลูก หรือใช้กากชา หว่านที่พื้น อัตรา อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่

กรณีพบที่วัสดุปลูก
พบหอยหรือทาก < 5 ตัวต่อตารางเมตร ให้เก็บไปทำลาย ถ้าพบ > 5 ตัวต่อตารางเมตร ให้ทำการป้องกันกำจัดโดยใช้เหยื่อพิษสำเร็จรูป เมทลดีไฮด์ 5% จีบี หรือกากชา 10% ชาโปนิน หว่านในอัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ วาง 5 จุด (4 มุมและตรงกลาง) บนวัสดุปลูกก่อนการให้น้ำ



กลุ่มอารักขาพืช
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
Plantprotectiongroupsamutsakhon



CONTACT US



กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเอกชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ : 034-423079



มิถุนายน
2566

ข่าวเตือน การระบาดของศัตรูพืช

สำนักเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร

โรคราน้ำฝนในลำไย
(เชื้อรา *Phytophthora capsici*)

พบการ
ในช่วง

พบได้ในระยะที่ลำไยพัฒนาผลไป
จนถึงในระยะการเก็บเกี่ยวผลผลิต

ลักษณะการเข้าทำลาย

มักพบการไหม้สีน้ำตาลเข้ม และเส้นใยสีขาว
เชื้อราขึ้นปกคลุม ต่อมาส่วนที่เป็นโรคจะ
อย่างรวดเร็ว หากระบาดรุนแรงจะทำให้ใบ
ยอดไหม้ทั้งต้น

อาการของโรคที่เกิดที่ผล : เปลือกผลและข้อผลมีสีน้ำตาล
ถ้าเกิดในระยะที่ผลลำไยยังแก่ไม่เต็มที่ ผลจะแตก เน่า และ
พบเส้นใยสีขาวของเชื้อราขึ้นปกคลุมและผลจะร่วงในที่สุด

แนวทาง
การ
ป้องกัน
กำจัด

1. หมั่นสำรวจตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบ
ต้นลำไยที่แสดงอาการของโรคใบไหม้ ให้ตัดแต่งส่วน
ที่เป็นโรคเก็บเศษซากพืชที่ร่วงหล่นในแปลงนำไปทำลาย
ทิ้งนอกแปลงปลูกทันที

2. พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เมทาแลกซิล 25% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 50
กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 80 ก



มิถุนายน
2566

ข่าวเตือน

การระบาดศัตรูพืช

สำนักเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร

โรคแอนแทรคโนส หรือ โรคกุ้งแห้งในพริก

พบได้ในทุกระยะการเจริญเติบโตของต้นพริก

การเข้าทำลาย

อาการเริ่มแรกจะพบจุดหรือแผลช้ำยุบตัวเล็กน้อย ต่อมาแผลขยายใหญ่เป็นวงรีหรือวงกลม บริเวณแผลพบส่วนของเชื้อราเป็นตุ่มสีดำขนาดเล็กเรียงเป็นวงซ้อนกัน ในกรณีที่สภาพอากาศชื้นจะเห็นเมือกเยิ้มสีส้มอ่อน ที่เป็นกลุ่มสปอร์ของเชื้อราสาเหตุโรค ถ้าอาการรุนแรงจะทำให้ผลเน่า ผลพริกที่เป็นโรคนี้จะได้งอบิดเบี้ยวคล้ายกุ้งแห้ง และจะร่วงหล่นก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต

แนวทางป้องกันกำจัด

1. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบโรคเริ่มระบาดให้เก็บผลพริกที่เป็นโรคนำไปทำลายทิ้งนอกแปลงปลูก
2. พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชอะซอกซีสโตรบิน 25% เอสซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ แมนโคเซบ 80% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 40-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไพโรคลอราซ 50% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 20-30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร โดยฉีดพ่นทุก 7-10 วัน และหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตพริกแต่ละรุ่นแล้วเกษตรกรควรเก็บเศษซากพืชที่หลงเหลือในแปลงปลูกนำไปทำลายทิ้งให้หมด และจัดระยะการปลูกพริกให้เหมาะสม ไม่ให้ปลูกชิดกันเกินไป
3. ก่อนจะเพาะปลูกใหม่ ควรแช่เมล็ดพันธุ์ในน้ำอุ่น 50 องศาเซลเซียส นาน 20-30 นาที อีกทั้งควรเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์หรือต้นกล้าจากแหล่งที่ปราศจากโรค กรณีที่เก็บเมล็ดพันธุ์เองควรเลือกผลพริกที่ไม่เป็นโรค

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร



กลุ่มอารักขาพืช
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
Plantprotectiongroupsamutsakhon



กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเอกชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ : 034-423079



มิถุนายน
2566

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร

ข่าวเตือน การระบาดของศัตรูพืช

หนอนเจาะผลส้มโอ

เตือน เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ เฝ้าระวัง ! หนอนเจาะผลส้มโอ
ในระยะติดผล - ระยะเก็บเกี่ยว

มักพบรอยเจาะทำลายของหนอน โดย
จะมีมูลที่ถ่ายออกมา และมียางไหลเยิ้ม

ทำให้ผลเน่าและร่วง
ก่อนการเก็บเกี่ยว

แนวทางในการป้องกันกำจัด

1. ควบคุมบังคับให้ต้นส้มโอแตกยอด ออกดอก และติดผล
ในระยะเดียวกัน เพื่อง่ายต่อการป้องกันกำจัด การดูแล
รักษา และช่วยลดปริมาณหนอนเจาะผลส้มโอ
2. เก็บหรือเด็ดผลอ่อนที่ถูกหนอนเจาะผลส้มโอเข้าทำลายนำ
ไปฝังนอกแปลงปลูกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดต่อไป
3. สำหรับในแหล่งปลูกที่พบการระบาดเป็นประจำ เกษตรกร
ควรหมั่นสำรวจหนอนเจาะผลส้มโอในแปลงปลูกช่วงที่
ต้นส้มโอติดผลอ่อน เมื่อผลส้มโออายุประมาณ 2 สัปดาห์
เกษตรกรควรพ่นด้วยสารฆ่าแมลงอิมิมาเมกตินเบนโซเอต
1.92% อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสาร
ฟิโพรนิล 5% เอสซี อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร
โดยพ่น 4 ครั้ง และพ่นห่างกันทุก 7 วัน จากนั้น เมื่อผล
ส้มโอ อายุประมาณ 1.5 เดือน เกษตรกรควรพ่นผลส้มโอ
ด้วยกุงกระต่ายหรือผลสีขาว เพื่อป้องกันการเข้าทำลายของ
หนอนเจาะผลส้มโอ

ในระยะที่ต้นส้มโอติดผล จะพบ
ตัวเต็มวัย เพศเมียวางไข่บนผล
ส้มโออายุประมาณ 2 สัปดาห์จนถึงระยะ
เก็บเกี่ยว โดยวางไข่เป็นฟองเดี่ยวหรือ
เป็นกลุ่มประมาณ 2-29 ฟอง เมื่อ
หนอนฟักจะกัดกินเข้าไปในผลส้มโอ

กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเอกชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ : 034-423079

กลุ่มอารักขาพืช
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
Plantprotectiongroupsamutsakhon